



新冠病毒疫苗接种系列宣传（一）

新冠未远离 疫苗护健康



吉林省新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室

◆ 1.新冠病毒疫苗有没有必要接种?




非常有必要接种。前期我国疫情得到了有效控制，没有形成大规模的暴发流行，人群因为感染新冠病毒获得的免疫力比例比较低，大多数居民对新冠病毒是易感的，感染发病后，有的人还会发展为危重症，甚至造成死亡。根据目前国际疫情形势来看，全球疫情仍处于大流行阶段，疫情仍将持续比较长的时间，甚至今后还要与我们共存，所以我们随时都可能因为传染源的引入而导致新冠疫情流行，甚至暴发流行。特别是北方地区气温低，病毒存活时

间会更长，人们活动在通风不好的室内，更容易造成病毒的传播。我们必须通过接种新冠病毒疫苗，一方面让绝大部分人可以获得免疫力，从而有效降低发病、重症和死亡的风险；另一方面，通过有序接种新冠病毒疫苗，可在人群中逐步建立起免疫屏障，阻断新冠肺炎的流行。

◆ 2.现阶段，新冠病毒疫苗适用对象是指哪些人群？

我国新冠病毒疫苗的接种对象为18周岁及以上人群。



◆ 3.别人都打疫苗了，我就可以不用打了吧？

这个观点是错误的。一方面就目前情况看，只有约80%的人群接种新冠病毒疫苗，才可以形成群体免疫屏障。另一方面，免疫屏障的作用是有效控制疫情传播，阻断疾病流行，但不代表个体不会感染，不打疫苗，你依然有被感染的风险。





新冠病毒疫苗接种系列宣传（二）

新冠病毒——健康之敌

疫苗接种——预防武器



吉林省新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室

◆ 1.新冠病毒疫苗在人体内是如何发挥作用的?

接种疫苗后，人体会产生保护性抗体，有的疫苗还会让人体产生细胞免疫，形成相应的免疫记忆。这样，人体就有了对抗疾病的免疫力。一旦有新冠病毒侵入人体，疫苗产生的抗体、细胞免疫释放的细胞因子就能识别、中和或杀灭病毒，而免疫记忆也很快调动免疫系统发挥作用，让病毒无法在体内持续增殖，从而达到预防疾病的目的。

◆ 2.目前，我国批准附条件上市或紧急使用的新冠病毒疫苗有几种?

我国已有5个生产企业的新冠病毒疫苗批准附条件上市或紧急使用。其中，附条件批准上市的有3个灭活疫苗和1个腺病毒载体疫苗；此外，还有1个重组新冠病毒疫苗(CHO细胞)获批紧急使用。

◆ 3. 获批的新冠病毒疫苗生产企业有哪些?

附条件批准上市的3个新冠病毒灭活疫苗产品分别由国药集团中国生物北京生物制品研究所有限责任公司（北京所）、武汉生物制品研究所有限责任公司（武汉所）和北京科兴中维生物技术有限公司（科兴中维）生产。

附条件批准上市的腺病毒载体疫苗为康希诺生物股份公司(康希诺)生产。

获批紧急使用的重组亚单位疫苗为安徽智飞龙科马生物制药有限公司（智飞龙科马）生产。



◆ 4.新冠病毒疫苗如何进行全程追溯工作?

《疫苗管理法》要求国家实行疫苗全程电子追溯制度。疫苗上市后，从生产、运输、储运、使用等各个环节均应有准确、规范的记录，全程追溯记录的信息包括疫苗品种、疫苗生产企业、剂型、规格、批号、有效期和预防接种个案信息等。各地通过预防接种信息化手段，将上述信息及时录入系统从而实现疫苗流通和使用的全程电子追溯。



新冠病毒疫苗接种系列宣传（三）

一份疫苗一份心
亲朋团聚更安心



吉林省新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室

◆ 1. 我们目前使用的疫苗安全吗？接种后会得病吗？

目前我省使用的是国药集团中国生物北京所和北京科兴中维公司生产的新冠病毒灭活疫苗。灭活疫苗已经使用上百年了，疫苗造成感染的情况是非常罕见的，一般都是发生于减毒活疫苗，发生率在百万分之一以下，现在使用新冠病毒的疫苗没有减毒活疫苗，全部是灭活疫苗，疫苗本身是不会造成感染的。



◆ 2.我省使用的新冠病毒疫苗需要接种几剂次？间隔多久？


我省居民接种的新冠病毒疫苗全部为灭活疫苗，需要接种两剂次；间隔是3周到8周，即首剂与第2剂之间的接种间隔要在3周及以上，第2剂在首剂接种后8周内尽早完成。

◆ 3.为什么新冠病毒灭活疫苗的剂次之间需要一定的间隔？

通常，灭活疫苗需多次接种才能达到较好的免疫效果。根据临床试验数据，新冠灭活疫苗第1剂次接种后可刺激机体产生部分免疫应答，第2剂次接种后能够产生较好的免疫效果。如未能在程序间隔要求的时间完成两剂接种的，应尽早补种。

◆ 4. 现阶段全程接种新冠病毒灭活疫苗后，还需要加强免疫吗？

现阶段暂不推荐加强免疫。





相信科学
接种疫苗
战胜新冠



新冠病毒疫苗接种系列宣传（四）



吉林省新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室

◆ 1.新冠病毒疫苗去哪儿打?

新冠病毒疫苗的接种都是在当地卫生健康行政部门批准的接种单位进行。通常情况下，接种单位设在辖区的卫生服务中心、乡镇卫生院或者综合医院。各地也会根据情况设立一些临时接种单位，并向社会公示。

◆ 2.打疫苗应如何预约?

通过“吉事办”APP、微信小程序进行网络预约。个人可点击“吉事办”首页上的新冠病毒疫苗预



约模块，预先录入接种所需的个人相关信息。个人预建档功能至关重要，将大幅节省接种现场登记排队时间，提高工作效率。

◆ 3. 接种新冠病毒疫苗前后有哪些注意事项？



应提前了解新冠疾病、新冠病毒疫苗相关知识及接种流程，准备好本人有效身份证件（如身份证、护照等），穿着宽松的衣服方便接种。

要出示本人有效身份证件（如身份证、护照等）并做好个人防护，配合现场预防接种工作人员询问，如实提供个人信息、健康状况和接种禁忌等信息。





需现场留观30分钟；如接种后发生不适，应报告接种单位，必要时及时就医。建议在日常生活中要保持接种局部皮肤的清洁，避免用手搔抓接种部位。





科学防控 接种疫苗



新冠病毒疫苗接种系列宣传（五）



吉林省新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室

◆ 1. 疫苗接种禁忌有哪些？



通常的疫苗接种禁忌包括：（1）对疫苗的活性成分、任何一种非活性成分、生产工艺中使用的物质过敏者，或以前接种同类疫苗时出现过敏者；（2）既往发生过疫苗严重过敏反应者（如急性过敏反应、血管神经性水肿、呼吸困难等）；（3）患有未控制的癫痫和其他严重神经系统疾病者（如横贯性脊髓炎、格林巴利综合症、脱髓鞘疾病等）；（4）正在发热者，或患急性疾病，或慢性疾病的急性发作期，或未控制的严重慢性病患者；（5）妊娠期妇女。

◆ 2. 新冠病毒疫苗接种常见的不良反应有哪些？

从前期新冠病毒疫苗临床试验研究结果和紧急使用时收集到的信息，我国新冠病毒疫苗常见不良反应的发生情况与已广泛应用的其他疫苗基本类似。常见的不良反应，主要表现为接种部位的红肿、硬结、疼痛等，也有发热、乏力、恶心、头疼、肌肉酸痛等临床表现。后续相关部门还将继续加强不良反应实时监测和评估。



◆ 3.为什么接种完疫苗后要留观30分钟？

疫苗接种总体来看是非常安全的，但接种疫苗后，可能有极少数人会出现急性过敏反应、晕厥等情况，且多在接种后30分钟内发生，一旦发生急性过敏反应，可以在现场及时采取救治措施，防止这些小概率情况给受种者造成意外伤害。因此，接种疫苗后需要在接种点留观30分钟。





新冠病毒疫苗接种系列宣传（六）

疫苗接种你我他 守护家园靠大家



吉林省新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室

◆ 1. 有高血压、糖尿病等慢性病可以接种新冠病毒疫苗吗？



慢性病人群感染新冠病毒后重症、死亡风险高。健康状况稳定，药物控制良好的慢性病人群不属于新冠病毒疫苗接种禁忌人群，建议接种。例如，在药物维持血压正常情况下的高血压患者和血糖控制在理想范围内的糖尿病患者，身体能够保持稳定、良好的状态，是可以接种疫苗的。

◆ 2.食物过敏、花粉过敏、青霉素等药物过敏可以接种新冠病毒疫苗吗？

如果受种者对疫苗过敏，或者对疫苗成份过敏，这是属于不能接种的。如果因食物过敏、花粉过敏，或者其他药物，包括青霉素过敏，因为和疫苗成分没有直接关系，不属于疫苗的接种禁忌，是可以接种疫苗的。

◆ 3.育龄期和哺乳期女性是否可以接种疫苗？

如果在接种后怀孕或在未知怀孕的情况下接种了疫苗，基于对疫苗安全性的理解，不推荐仅因接种新冠病毒疫苗而



采取特别医学措施（如终止妊娠），建议做好孕期检查和随访。对于有备孕计划的女性，不必仅因接种新冠病毒疫苗而延迟怀孕计划。

虽然目前尚无哺乳期女性接种新冠病毒疫苗对哺乳婴幼儿有影响的临床研究数据，但基于对疫苗安全性的理解，建议对新冠病毒感染高风险的哺乳期女性（如医务人员等）接种疫苗。考虑到母乳喂养对婴幼儿营养和健康的重要性，参考国际上通行做法，哺乳期女性接种新冠病毒疫苗后，建议继续母乳喂养。





接种新冠疫苗 利己利家利国



吉林省新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室

◆ 1. 曾经感染过新冠病毒是否还需要接种新冠病毒疫苗？

现有研究数据表明，新冠病毒感染后6个月内罕见再次感染发病的情况。既往新冠肺炎病毒感染者（患者或无症状感染者），在充分告知基础上，可在6个月后接种1剂。

◆ 2. 接种新冠病毒灭活疫苗后，多久才能产生抗体？

根据前期新冠病毒灭活疫苗临床试验，接种第2剂次灭活疫苗大约两周后，接种人群可以产生较好的免疫效果。





◆ 3. 接种前后是否有必要检测抗体？

在疫苗接种前后无需开展新冠病毒核酸及抗体检测；接种后也不建议常规检测抗体作为免疫成功与否的依据。

◆ 4. 接种新冠病毒疫苗后可以放松个人防护措施吗？

接种疫苗后虽然可以产生免疫力，可以大大降低感染风险，但任何疫苗保护作用不可能100%，部分人接种后有可能不产生足够抗体，仍然会有感染风险，

特别是在还没有建立起群体免疫屏障的情况下。所以，接种疫苗后，常态化防控意识不能放松，在日常生活中仍需保持“佩戴口罩、勤洗手、常通风，注意保持安全社交距离”等良好生活习惯。

勤洗手

用流水+洗手液或肥皂，
每次洗手至少20秒



戴口罩

医用外科口罩N95口罩
可以有效抵挡飞沫中的
病毒传播



常通风

每天三次开窗换气，保
持通风



离人群

注意保持安全社交距离

